LYNOX®

Inhibiteur de l'anhydrase carbonique

Dans quel cas le médicament LYNOX® est-il prescrit ?

Ce médicament contient un inhibiteur d'une *enzyme* particulière : l'anhydrase carbonique. Le blocage de cette *enzyme* a pour effet :

- d'augmenter l'élimination d'eau et de bicarbonate par les reins (effet *diurétique*) ;
- de faire baisser la pression des liquides contenus dans le cerveau ou dans l'œil (baisse de la *tension intraoculaire*).

Il est utilisé dans le traitement du *glaucome* aigu et dans le *traitement symptomatique* du mal des montagnes.

Présentations du médicament LYNOX®

LYNOX®: comprimé sécable; boîte de 20

Composition du médicament LYNOX®

	p cp
Acétazolamide	250 mg

Contre-indications du médicament LYNOX®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- *allergie* aux *sulfamides* (auxquels ce médicament est apparenté) ;
- *insuffisance hépatique*, rénale ou *surrénale* grave ;
- *antécédent* de *colique néphrétique.*
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Des précautions sont nécessaires chez les personnes âgées, les diabétiques et les personnes présentant un excès d'acide dans le sang.

En cas d'utilisation prolongée, des analyses de sang régulières peuvent être nécessaires.

Sportif : ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains *tests antidopage*.

Interactions du médicament LYNOX® avec d'autres substances

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un médicament contenant de la carbamazépine, de l'hydroquinidine ou de la quinidine.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. Par prudence, son usage est déconseillé chez la femme enceinte ou chez celle qui allaite.

Mode d'emploi et posologie du médicament LYNOX®

Ce médicament doit être pris avec un verre d'eau, de préférence au cours des repas.

Posologie usuelle :

La posologie est variable d'un sujet à l'autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun.

Seul le médecin peut la définir.

Conseils

La meilleure prévention du mal aigu des montagnes reste le plan d'ascension progressif pour les altitudes supérieures à 3 000 m. Les paliers observés permettent à l'organisme de s'adapter au manque d'oxygène. Si une crise survient (nausées, maux de tête, léthargie), la descente rapide reste le meilleur traitement.

Effets indésirables possibles du médicament LYNOX®

Fourmillement des membres disparaissant généralement après quelques jours, urines plus abondantes.

Plus rarement :

- fatigue ;
- *réaction allergique* ;

- baisse du taux de potassium dans le sang, élévation anormale de la glycémie ;
- excès d'*acide urique* dans le sang, crise de *goutte* ;
- calcul rénal ;
- myopie transitoire ;
- *troubles digestifs*.